pillard

No. 49.

Observation sur un étranglement de l'intestin ileum, causé par des hydatides dessechées

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Un homme âgé de vingt sept ans, tisserand de son métier, vint il y a quelque tems à mon hopital; il portoit depuis plusieurs années une hernie inguinale au Coté gauche. L'ayant examiné, je le trouvai en fort mauvais état, il se plaignoit et s'agittoit sans cesse dans son lit; il éprouvoit à la région épigastrique une angoisse inexprimable, il avoit des nausées fréquentes, des foiblesses suivies de sueurs froides, le pouls petit et concentré &c... je crus d'après ces simptômes ne pouvoir douter d'un étranglement à l'intestin... j'examinai donc la hernie ou je devois rencontrer cet étranglement; elle étoit de la grosseur d'un oeuf d'oïe; elle étoit molle, sans changement de couleur à la peau, et la pression n'y causoit aucune douleur, le tact m'assura que la

ARC 56 n°49

tumeur n'étoit formée que par l'intestin, je fus surpris de la trouver dans un état aussi bénin, et je le fus bien plus encore, lorsque par un taxis méthodique la hernie rentra avec un leger gargouillement. il étoit alors huit heures du matin je donnai un lavement au malade et le tins à la diète, les accidens ne diminuerent point, ils étoient même un peu augmentés sur le Soir, ou je trouvai la ~~malade~~ hernie sortie par les efforts que le malade avoit fait pour vomir; je la fis rentrer avec la même facilité que le matin, et j'y appliquai ensuite un bandage: le malade passa la nuit dans l'agitation et l'insomnie, il eut plusieurs foiblesses et un vomissement de matieres fécales; je lui otai le bandage Sur le matin, et la hernie reparut aussitot dans le même état de bénignité ou je l'avois vû la veille ... l'état du malade devenoit de plus en plus pressant, tous les Simptômes annonçoient avec l'évidence la plus claire un Etranglement à l'intestin, et l'indispensable nécessité d'en

venir à une opération ... avant d'y proceder
je fis beaucoup de questions au malade, et
j'examinai avec la plus scrupuleuse attention
toutes les circonstances de son état, afin de me
diriger plus surement dans l'opération douteuse
que j'allois entreprendre .... Outre les simptômes
d'Etranglement dont j'ai parlé, le ventre étoit
tendu, et il y avoit à trois pouces audessus de la
tumeur, du coté de l'ombilic, un point assez doulour.
lorsqu'on le prenoit; Ce lieu me parut être celui ou
existoit l'etranglement, vû que la hernie rentroit
aisément, et que le malade n'y éprouvoit point de
douleur particuliere; d'ailleur le malade avoit depuis
plusieurs mois constamment ressenti ce point plus
douloureux, et éprouvé de tems en temps des coliques
et des constipations qui ayant augmentés depuis huit
jours l'avoient insensiblement conduit à cet etat
misérable ... il avoit aussi quelques mois auparavant
éprouvé les accidens d'une hidropisie naissante, tels

ARC 56 n°49

que le ventre tendu et les jambes enflées; accidens qui disparurent au moyen d'une medecine et d'urines abondantes .... ayant preparé ce qui convenoit, je découvris le sac herniaires selon les regles de l'Art, il étoit un peu épais, voyant qu'il n'avoit point d'adherences avec l'intestin, j'en fis aisément l'ouverture, je trouvai que la hernie n'étoit formée que par un anse de l'intestin grêle, et que celui-ci n'avoit d'autre affection qu'un peu de pâleur, je le saisis et le tirai doucement pour voir ou étoit le mal, j'en tirai près d'un pied, sans trouver le moindre étranglement, ni aucun vice qui pût étrécir le calibre intestinal, seulement les tuniques devenoient plus rouges et enflammées, et en tirant l'intestin je causois des douleurs de plus en plus fortes, de sorte que trouvant même de la résistance je fus obligé d'en rester-la, et d'abandonner le malade à la nature ou plutot à la mort. - - il mourut effectivement la nuit

suivante. l'ouverture du cadavre me fit voir une grande quantité d'hidatydes repanduës sur la surface des viscères et une portion de l'ileum gangrenée près de l'ombilic. Il y avoit là un étranglement formé par une espece de bride ligamenteuse, laquelle naissant ~~sur~~ l'intestin, un pouce audessus de l'endroit ou il se courboit pour former une anse; alloit de l'autre côté s'attacher à la portion d'anse correspondante; de sorte qu'elle adossoit presque les deux portions de l'anse; Cette bride avoit la largeur et l'épaisseur d'une ligne dans son milieu, et s'épanouissoit aux endroits ou elle s'attachoit à l'intestin; Celui-cy étoit étranglé dans les endroits... d'ailleurs le mesentere et les portions d'intestins voisines étoient adhérentes par l'inflammation qui les avoit unies... Cette bride ne m'a paru formée que par des hydatydes dont les tuniques se

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

sont dessechées, il paroit que le sujet en avoit
eu des considerables, par lespece d'hidropisie
dont il avoit eu les simptômes, le moment ou
cette maladie disparut sous l'écoulement d'urines
abondantes paroit avoir été celui ou quelques
~~abondantes~~ fortes hydatydes se sont rompuës
pour donner lieu à cette bride ligamenteuse,
ce qui rend la chose vraisemblable, c'est que les
accidens de colique et de constipation ne
devinrent inquietans qu'aprés que l'abondance
d'urines eut dissipé cette hidropisie naissante

Picard chirurgien de
l'hopital de Bar sur aube

a Bar sur aube ce quatorze novembre 1781

Rapport d'une observation envoyée a l'academie par mr pillard chirurgien de l'hopital de bar sur aube

concernant un etranglement de l'intestin ileum causé par des hydatides dessechées.

Le particulier qui fait le sujet de cette observation agé de 27 ans, portoit depuis plusieurs années une hernie inguinale du coté gauche, lorsque s'etant trouvé fort incommodé il vint a l'hopital. Le chirurgien le trouva se plaignant et s'agitant dans son lit, eprouvant des angoisses des nausées frequentes, des foiblesses suivies de sueurs froides: le poulx etoit petit et concentré. Cependant la tumeur herniaire etoit molle sans changement de couleur à la peau. la pression des doigts ne causoit aucune douleur elle determinoit meme la rentrée de l'intestin avec un leger gargouillement. Les accidens cy dessus enoncés loin de diminuer furent suivis de vomissemens de matieres stercorales, le ventre devint tendu et l'etat du malade plus pressant. avant de se determiner a une operation dont le succès paroissoit douteux le chirurgien estima devoir preter toutte les circonstances qui avoient precedés, et accompagnoit l'etat facheux du malade. il reconnut a trois pouces audessus de la tumeur herniaire du coté de l'ombilic un point douloureux que le malade avoit ressenti depuis plusieurs mois, et plus vivement depuis 8 jours accompagné de coliques et de constipations. ce point de douleur parut a Mr pilard le siege de l'etranglement, ~~mais~~ il ne fut pas celui de l'operation, elle fut faitte comme de coutume par l'ouverture de la tumeur et du sac herniaire, sous lequel il trouva une anse d'intestin grele. il en tira alors environ un pied de longueur qu'il trouva a peu pres dans l'etat sain, il n'en put tirer davantage. L'intestin se trouvant resistant les tuniques rouges et enflammées, L'auteur se crut obligé d'abandonner le malade au soin de la nature.

cette observation presente un nouvel exemple d'un etranglement interieur dans un lieu de la capacité du ventre eloigné de la tumeur herniaire. on ne sauroit blamer le chirurgien de n'avoir pas

pratiqué

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

pratique la gastrotomie, mais forcé d'abandonner le malade comme l'auteur le dit lui meme à une mort certaine, ne devoit il pas prolonger l'incision de l'anneau jusqu'au point determiné de la douleur ? l'ouverture du cadavre a demontré que la section d'une bride ligamenteuse pouvoit ~~[illegible]~~ l'espoir de sauver la vie du malade.

il nous paroit que cette observation ne sçauroit être utile ~~[illegible]~~ a l'academie que pour enhardir les praticiens en Etablissant un precepte sur la maniere dont ils devront se conduire en pareil circonstance

Le 18 juillet 1782

[illegible signature]